

Основные признаки и симптомы употребления психоактивных веществ

I. Основные признаки:

1. следы от уколов (особенно на руках);
2. наличие у ребенка (подростка) ложек и/или узких полых трубочек, шприцев и/или игл от них;
3. наличие капсул, таблеток, порошков, пузырьков из-под лекарственных или химических препаратов;
4. расширенные или суженные зрачки;
5. нарушение речи, походки и координации движений при отсутствии запаха алкоголя;
6. покраснение склер.

II. Дополнительные признаки:

1. лживость, изворотливость;
2. проведение времени в компаниях асоциального типа;
3. вымогательство и/или кража денег у окружающих;
4. нарушения сна;
5. телефонные разговоры (особенно «зашифрованные») с незнакомыми лицами;
6. частые беспричинные смены настроения;
7. внешняя неопрятность;
8. снижение успеваемости в учебном заведении;
9. пропажа из дома ценных вещей;
10. сужение круга интересов;
11. частый беспричинный кашель;
12. снижение аппетита;
13. запоры;
14. изменение пищевых пристрастий (предпочтение сладких кондитерских изделий, постоянный отказ от жирной и мясной пищи);
15. похудание;
16. гнойничковые поражения кожи, флегмоны, абсцессы по ходу вен;
17. появление денежных долгов с не очень убедительным объяснением их происхождения;
18. регулярные в одно и то же время отлучки из дома на не очень продолжительное время;
19. стремление избегать одежды с короткими рукавами даже в жаркие дни;
20. прожженная сигаретами одежда, обивка мебели, ковры;
21. чрезмерно длительное пребывание утром в ванной, туалете.